

**BOLLETTINO SETTIMANALE DEI POLLINI
E SPORE AERODISPERSE**
Dipartimento ARPAT di Pistoia
Stazione di Lido di Camaiore



concentrazione x m3 d'aria

Settimana dal 22/03/2010 al 28/03/2010	lun 22	mar 23	mer 24	giov 25	ven 26	sab 27	dom 28	media
Graminaceae (<i>erba marzolina, avena e al.</i>)	2,2	0,6	2,6	3,8	2,9	0,3	1,6	2,0
Oleaceae (<i>olivo e frassino</i>)	1,6	4,5	2,2	3,8	9,0	3,5	1,6	3,7
Urticaceae (<i>parietaria e ortica</i>)	36,2	27,5	42,2	69,8	33,3	35,5	28,2	38,9
Cupressaceae/tax (<i>cipresso e tasso</i>)	139,2	148,8	467,2	398,1	94,4	52,5	145,9	206,6
Platanaceae (<i>platano</i>)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,1
Betulaceae (<i>ontano e betulla</i>)	8,0	115,5	75,5	18,6	3,2	1,9	1,9	32,1
Fagaceae (<i>quercia, faggio, castagno</i>)	1,3	0,3	0,0	3,2	0,0	0,6	0,0	0,8
Compositae (<i>ambrosia, artemisia e altri</i>)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corylaceae (<i>nocciolo e carpino</i>)	0,3	2,9	5,1	5,1	2,2	0,6	6,7	3,3
Pinaceae (<i>Pino, abete, cedro</i>)	2,2	6,1	1,6	14,7	6,4	1,6	1,9	4,9
Alternaria	3,5	1,6	7,0	5,8	8,3	6,4	4,5	5,3

pollini

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
	assente
np	non pervenuto

alternaria

	Concentrazione bassa
	Concentrazione alta
	assente
np	non pervenuto

